セミの抜け殻調査報告書2012

部分を入力　ニイニイゼミの♂♀識別は不要（任意で入力できます）　ブルダウンから選択　部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2012
都道府県名	神奈川県
調査地名	横浜市港北区新横浜　新横浜公園
サイト名	鳥山大橋際
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口　義明
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ(ソメイヨシノ)
調査地関連HP	
調査参加者数	大人14／中学生0／小学生5／幼児0 (8/27)

種	♂♀	7/25	8/1	8/17	8/27	/	/	/	/	/	/	計
ニイニイゼミ	不明	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	1	1	8	2	0	0	0	0	0	0	12
ミンミンゼミ	♀	0	5	7	6	0	0	0	0	0	0	18
ミンミンゼミ	計	1	6	15	8	0	0	0	0	0	0	30
アブラゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	♂	17	76	209	202	0	0	0	0	0	0	504
アブラゼミ	♀	0	20	217	281	0	0	0	0	0	0	518
アブラゼミ	計	17	96	426	483	0	0	0	0	0	0	1,022
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ツクツクボウシ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	計	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ヒグラシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	18	103	442	491	0	0	0	0	0	0	1,054

	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	1	0	0	0
ミンミンゼミ計	30	0	0	0
アブラゼミ計	1,022	0	0	0
ツクツクボウシ計	1	0	0	0
ヒグラシ計	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0
（自由入力）	0	0	0	0
総計	1,054	0	0	0

総計に自由入力は含まれていません
自由入力に入力した場合には
グラフのデータ範囲を修正してください。





コメント：(改行：ALT+ENTER)
今年2012年より、パルシステム神奈川ゆめコープの環境マネジメントシステム（EMS）新横浜本部サイトとしてセミの抜け殻調査をスタートしました.この取り組みは点から線、線から面のデータを蓄積し、比較検証することが不可欠です.当組合の継続した取り組みと位置づけ取り組むとともに、今後広く内外に広めて行きたいと考えています.



セミの抜け殻調査報告書2013

年度	2013
都道府県名	神奈川県
調査地名	横浜市新横浜鳥山橋
サイト名	（橋の先）
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	林　和則
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	
調査地関連HP	
調査参加者数	大人　　中学生　　小学生　　幼児

種	♂♀	7/24	8/19	8/28	計
ニイニイゼミ	不明	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♂	1	0	0	1
ニイニイゼミ	♀	0	0		0
ニイニイゼミ	計	1	0	0	1
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	15	12	1	28
ミンミンゼミ	♀	0	11	6	17
ミンミンゼミ	計	15	23	7	45
アブラゼミ	不明	0	0	0	0
アブラゼミ	♂	103	441	47	591
アブラゼミ	♀	13	609	78	700
アブラゼミ	計	116	1,050	125	1,291
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♀	0	0	1	1
ツクツクボウシ	計	0	0	1	1
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明	0	0	0	0
（自由入力）	♂	0	0	0	0
（自由入力）	♀	0	0	0	0
（自由入力）	計	0	0	0	0
	合計	132	1,073	133	1,338





	2013	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	1	1	0	0	0
ミンミンゼミ計	45	30	0	0	0
アブラゼミ計	1,291	1,022	0	0	0
ツクツクボウシ計	1	1	0	0	0
ヒグラシ計	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0
（自由入力）	0	0	0	0	0
総計	1,338	1054	0	0	0



コメント：（改行：ALT+ENTER）
分析担当（小久保）コメント：
アブラゼミの比率が圧倒的に多いですが、ミンミンゼミが約3.5%にニイニイゼミとツクツクボウシの抜け殻も採取されているということで、多様性には富んでいると言えます。アブラゼミ以外の抜け殻が採取できる場所は限定されていませんか。そういう場所に、何か特徴はないでしょうか。
2012年との比較ではアブラゼミもミンミンゼミも増えていますが、首都圏全体の傾向と同じです。

セミの抜け殻調査報告書2014

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　■プルダウンから選択　■部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2014
都道府県名	神奈川県
調査地名	横浜市新横浜鳥山橋
サイト名	（橋の先）
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	遠藤　健一
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	
調査地関連HP	
調査参加者数	大人　　中学生　　小学生　　幼児

種	♂♀	7/23	8/18	8/26	計
ニイニイゼミ	不明	1	0	0	1
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	1	0	0	1
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	2	4	7	13
ミンミンゼミ	♀	0	3	9	12
ミンミンゼミ	計	2	7	16	25
アブラゼミ	不明	0	0	0	0
アブラゼミ	♂	269	462	84	815
アブラゼミ	♀	62	261	156	479
アブラゼミ	計	331	723	240	1,294
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	2	1	3
ツクツクボウシ	♀	0	0	1	1
ツクツクボウシ	計	0	2	2	4
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明	0	0	0	0
（自由入力）	♂	0	0	0	0
（自由入力）	♀	0	0	0	0
（自由入力）	計	0	0	0	0
	合計	334	732	258	1,324





	2014	2013	20112	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	1	1	1	0	0	0
ミンミンゼミ計	25	41	30	0	0	0
アブラゼミ計	1,294	1,295	1022	0	0	0
ツクツクボウシ計	4	1	1	0	0	0
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	0	0	0	0	0	0
総計	1,324	1338	1054	0	0	0